

■ Trostomaat

'Laat die warme en vooral lichte zomer maar komen'

Het gewas Capricia op onderstam groeit bij Eric Geurts in Oirlo nog erg goed. En dat terwijl de plantbelasting nog erg hoog is. Eind vorige week telde hij nog 168 vruchten per vierkante meter. "Ook op een plotseling warme dag groeit het perfect door. Laat die warme en vooral lichte zomer maar komen." Voor de werknemers staat ook alles klaar voor de zomer. Ze hebben petjes en op de buisrailkarren is een ventilator gemonteerd. Vorig jaar werd Capricia in de donkere augustusmaand te vol, maar dat hoopt Geurts nu te voorkomen. De plantbelasting neemt nu wel af, want hij oogst veel de laatste weken. Om het gewas generatief te houden laat hij de dagtemperatuur tot 24 à 25 graden Celsius oplopen. De voornacht



Niet alleen het gewas staat bij Eric Geurts klaar voor de zomer. De medewerkers krijgen op de karren een verfrissend windje van de ventilator.
Foto: Gé Hirdes

staat ingesteld op 15,5 graden, maar bij koude avonden op 16 graden. "Het moet niet te snel afkoelen, want dat gaat ten koste van de snelheid." De nachtinstelling is 17 graden, met een minimumbuis van 35 graden en om 5.00 uur stookt hij naar 18 graden, met een minimumbuis van 45 graden tot 9.00 uur. "Als de buffer vol is, beginnen

we een uurtje eerder met de minimumbuisverhoging. Dat kan ook geen kwaad voor de Botrytisbestrijding." In een van de twee afdelingen is ruim 1 meter onder de kop hier en daar wat Botrytis te zien. Dat ontstond half mei. "Misschien was de worteldruk door de lage voornacht toch te hoog. Het is niet dramatisch, maar het uitsnijden en insme-

Viper

ren met een mix van Scania Vital en Rovral kost natuurlijk wel tijd." De druppel-ec staat nu nog op 2,8 mS, maar als het echt zomer wordt verlaagt hij deze naar 2,6. Variëren op de dag is niet mogelijk, omdat hij doseert vanuit de voorraadsilo. In productie loopt het gewas nog 2 kilo per vierkante meter achter op vorig jaar. Dat is meer dan op grond van de vijftien dagen latere plantdatum viel te verwachten. "Maar we lopen nu wel in. We oogsten nog de eerste ongebeugelde trossen, die door kniktrossen wat lichtere tomaten hebben. Hierna wegen de tomaten gemiddeld 120 gram." Geurts snoeit nog steeds op zes vruchten. "Afhankelijk van de plant ga ik na de langste dag over naar vijf per tros." De ziektedruk is laag. Per week staan de zwaveldampers twee nachten aan. "Ik heb nog helemaal geen meeldauw gezien." ■

■ Paprika

'Naast de plussen noem ik ook de minnen'

Teelttechnisch gaat het 'helemaal naar het zin' bij Gerrit Bergwerff in Maasdiik. "Vanaf week 16 zijn we begonnen met rood oogsten en daarna is het alleen maar achter elkaar doorgegaan. Dat heb je met een late planting; dat het in één keer doorloopt. De regelmaat blijft er in zitten. Wel oogsten we frequent. Twee keer in de week gaan we rond. Zo zit je er kort op en bouw je die regelmaat er ook in. "De vruchten blijven erg grof, 90 procent is 85'ers. We begonnen met vruchten van 250

gram en zelfs nu, in week 22, zitten we nog op 235 gram. Daar ben ik wel content mee." "Gelukkig hebben we wat betreft ziekten en plagen nergens last van. Een enkeling heeft te maken met binnenrot, hoor ik, maar wij hebben geen zware bloemen gehad. Het gewas is in groei en zetting steeds goed in balans geweest. Is dat niet het geval met veel groei en grote bloemen, dan wordt het erg gevoelig voor binnenrot. Het gewas is een halve meter korter dan dat van een vroege teler, met toch dezelfde productie, dus dat geeft al aan dat het heel mooi in balans is gebleven. Maar naast de plussen noem ik ook de minnen. In week 20 moesten we door heel de tuin

de snijvlakken van de al eerder van de stam gesneden paprika's bijsnijden. We zagen er toch behoorlijk veel rotte plekken op komen, vooral op stukjes steel die niet mooi waren afgesneden, of waar een touwtje langs liep, dus waar de wond niet mooi was opgedroogd. De oorzaak konden we niet uit het klimaat halen, dus dat is toch een stukje gevoeligheid van het ras Viper. We hebben daar dus meteen op geanticipeerd, want het trekt snel naar binnen en dan raak je toch zomaar opeens stengels kwijt. Met bijsnijden blijf je dat voor. Misschien hadden we er ook wel een of ander spul voor kunnen spuiten, maar we hebben op safe gespeeld. De oorzaak moet je zoeken in

de donkere februari maand. Het is toch een lichte vorm van zwakte van dit ras. Nu zie je dit probleem niet meer, omdat het allemaal wat harder wordt. Ik geef nog steeds water met een ec van 3 mS. Bij heel veel zon mag hij 0,4 mS zakken. We proberen de ec in de mat op 3,5 mS te houden. We waren in vergelijking met vorig jaar - met toen Spider - al wat hoger gestart met 4 mS. Een collega startte zelfs met 5 mS, zeg maar een tomatenschema. Die had helemaal geen rot. Dus die ec mag best wat hoger, want Viper is toch wat kruidachtig. Achteraf gezien had ik dus iets hoger met de ec kunnen gaan zitten." ■